

Material suplementario

Tabla s1. Análisis de modelo de regresión ajustado para estimar riesgo relativo entre las escalas de riesgo y la mortalidad en pacientes menores de cinco años con neumonía adquirida en la comunidad, Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú, 2013 – 2015. (n=1351)

Variables	RRa*	(IC 95%)
PIROm		
Presencia de comorbilidades	2,11	1,31 - 3,39
Edad <06 meses	3,58	2,24 - 5,72
Sat O ₂ < 90%	9,09	5,69 - 14,52
Hipotensión ^(d)	4,42	3,66 - 5,34
Bacteriemia	1,18	0,52 - 2,67
Neumonía multilobar	2,63	1,63 - 4,23
Neumonía complicada	1,90	0,20 - 12,53
Falla renal aguda	19,45	13,32 - 28,40
Síndrome de distrés respiratorio	112,17	57,84 - 217,53
Falla hepática	15,16	8,96 - 25,63
PRESS		
Taquipnea ^(e)	1,57	0,87 - 2,80
Sibilantes	1,51	0,92 - 2,49
Uso de músculos accesorios ^(f)	1,00	0,41 - 2,43
Sat O ₂ ≤95	13,85	4,30 - 43,90
Dificultad para alimentarse	2,85	0,90 - 8,99
RISC VIH -		
Sat O ₂ ≤90	9,68	5,65 - 16,59
Tiraje intercostal ^(g)	1,01	0,41 - 2,43
Sibilantes	1,51	0,92 - 2,49
Rechaza alimentación	1,51	0,92 - 2,49
Peso para la edad**		
Bajo (≤ -2 z-score)	2,15	0,90 - 4,72
Muy bajo (≤ -3 z-score)	5,87	3,40 - 10,14

RRa: Riesgo relativo ajustado, IC95%: Intervalo de confianza al 95%