

Material suplementario.

Tabla suplementaria 1. Análisis de regresión crudo y ajustado para la asociación entre el peso no saludable según el índice de masa corporal y el estrato socioeconómico según lugar de residencia en pacientes con DM1 atendidos por consulta externa en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, periodo 2018-2022 (n=165)

	Análisis Bivariado			Regresión múltiple ^a		
	RPc	IC 95%	p-valor	RPa	IC 95%	p-valor
Estrato socioeconómico según lugar de residencia ^b						
Estratos medios y altos	Ref			Ref		
Estratos bajos	2,34	1,34 - 4,09	0,003	2,48	1,43 - 4,28	0,001
Edad	1,05	0,97 - 1,12	0,215	1,03	0,96 - 1,10	0,373
Sexo						
Femenino	Ref			Ref		
Masculino	1,93	1,03 - 3,59	0,039	2,04	1,10 - 3,80	0,024
Control glucémico						
Buen control	Ref			Ref		
Mal control	1,12	0,55 - 2,26	0,752	0,92	0,46 - 1,85	0,827
Tiroiditis autoinmune						
Ausente	Ref			Ref		
Presente	0,75	0,37 - 1,46	0,398	1,13	0,60 - 2,15	0,693

RPc: Razón de prevalencia crudo, RPa: Razon de prevalencia ajustado. IC 95 %: intervalo de confianza. Ref: valor referencial

a. Regresión ajustada por sexo, edad, control glucémico y tiroiditis autoinmune b. Estrato socioeconómico según lugar de residencia: valoración indirecta a partir de los "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de Manzanas según el Ingreso Per cápita del Hogar", estratos bajos (bajo y medio bajo) y medio a alto (medio,